EPIPEN PROCEDURE

Storage

- Store adrenaline auto-injector at room temperature, away from heat and light, in its original packaging. Check expiry date regularly

Action

- Before use, verify:
  - Correct patient
  - Correct adrenaline auto pen (brand/type)
  - Dose and expiry date
  - Date and time of application
- If unconscious: place in the recovery position, loosen clothing and do not over crowd.
- If conscious: patient to lie down with legs raised (unless they have breathing difficulties, in which case to sit up). Never leave alone.
- Administering auto-injector:
  - No need to remove light clothing
  - Hold pen in dominant hand, thumb nearest the safety cap, form first around pen (tip down)
  - Remove the safety cap or shield
  - Inject into outer mid-thigh at right angle (90°)
  - Hold firmly for 10 seconds, then remove
  - Massage site gently for 10 seconds

Next steps

- Dispose of the auto-injector safely – either give the used device to the paramedics to dispose of or put it back into the box and then take it back to the community pharmacy.
- Record the administration on Famly and document in the person's care plan as follows:
  - Record site, dose and time given on Famly and outcome in the person's care plan.
  - Notify carers / medical staff of anaphylactic episode
- Get urgent medical attention: dial 999
- If the ambulance services have not arrived 15 minutes after the first adrenaline (epinephrine) pen has been administered then administer a second.
  - A person can have no more than two adrenaline auto-injector administrations
- Contact the nursery manager to inform them of the situation to aid communication.
- Ensure that a replacement auto injector is obtained from the GP.

Additional guidance: refer to official manufacturer or NHS training videos for a visual demonstration.

This policy was adopted on	Signed on behalf of the nursery	Date for review

27/10/2025	*L.George*	*10/2027*

GWEITHDREFN EPIPEN

Storio

- Storiwch chwistrellwr adrenalin awtomatig ar dymheredd ystafell, i ffwrdd o wres a golau, yn ei becynnu gwreiddiol. Gwiriwch y dyddiad dod i ben yn rheolaidd

Camau gweithredu

- Cyn ei ddefnyddio, gwiriwch:
    - Y claf cywir
    - Pen adrenalin awtomatig cywir (brand/math)
    - Dos a dyddiad dod i ben
    - Dyddiad ac amser y defnydd
- Os yw'n anymwybodol: rhowch yn y safle adfer, llacio dillad a pheidiwch â gorlenwi.
- Os yw'n ymwybodol: i'r claf orwedd i lawr gyda'i goesau wedi'u codi (oni bai bod ganddo anawsterau anadlu, ac os felly i eistedd i fyny). Peidiwch byth â'i adael ar ei ben ei hun.
- Rhoi chwistrellwr awtomatig:
    - Dim angen tynnu dillad ysgafn
    - Daliwch y beiro yn eich llaw drech, y bawd agosaf at y cap diogelwch, ffurfiwch yn gyntaf o amgylch y beiro (y blaen i lawr)
    - Tynnwch y cap diogelwch neu'r darian
    - Chwistrellwch i ganol y glun ar ongl sgwâr (90°)
    - Daliwch yn gadarn am 10 eiliad, yna tynnwch
    - Tylino'r safle'n ysgafn am 10 eiliad

Camau nesaf

- Gwaredu'r chwistrellwr awtomatig yn ddiogel – naill ai rhowch y ddyfais a ddefnyddiwyd i'r parafeddygon i'w gwaredu neu ei rhoi yn ôl yn y blwch ac yna mynd â hi yn ôl i'r fferyllfa gymunedol.
- Cofnodwch y weinyddiaeth ar Famly a'i dogfennu yng nghynllun gofal y person fel a ganlyn:
    - Cofnodwch y safle, y dos a'r amser a roddir ar Famly a'r canlyniad yng nghynllun gofal y person.
    - Hysbysu gofalwyr / staff meddygol am bennod anaffylactig
- Cael sylw meddygol brys: ffoniwch 999
- Os nad yw'r gwasanaethau ambiwlans wedi cyrraedd 15 munud ar ôl rhoi'r beiro adrenalin (epinephrine) cyntaf yna rhoi un arall. o Ni all person gael mwy na dau weinyddiaeth chwistrellwr adrenalin awtomatig
- Cysylltwch â rheolwr y feithrinfa i'w hysbysu o'r sefyllfa er mwyn cynorthwyo cyfathrebu.
- Gwnewch yn siŵr bod chwistrellwr awtomatig newydd yn cael ei gael gan y meddyg teulu.

Canllawiau ychwanegol: cyfeiriwch at fideos hyfforddi swyddogol y gwneuthurwr neu'r GIG am arddangosiad gweledol.

Mabwysiadwyd y polisi hwn ar	Llofnodwyd ar ran y feithrinfa	Dyddiad adolygiad nesaf
27/10/2026	*L.George*	*10/2027*